

Requisitos de vacunación para el año escolar 2015 - 2016

K.A.R. 28-1-20 detalla las vacunas necesarias para cualquier individuo que asiste a la escuela o un programa de cuidado de niños operados por una escuela. Hay cambios en los requisitos para las vacunas para el próximo año escolar. Por favor revise con cuidado los requisitos abajo. El número usual de dosis requeridos están en la lista;

si embargo hay ciertas situaciones que podrían alterar el número de dosis que un niño necesita. Si tiene preguntas acerca de las vacunas de su niño, contacte al doctor de su niño o departamento local de salud.

Se debe proporcionar evidencia de las vacunas a la escuela antes de asistir al primer día de clases

Programa de niños de temprana edad operado por las escuelas edad de 4 años para abajo

Vacunas	Se requiere
DTaP/DT (difteria, tétano, tosferina)	4 dosis
IPV (polio)	3 dosis
MMR (sarampión, paperas, rubéola)	1 dosis
Varicella (chickenpox)	1 dosis*
Hepatitis A	2 dosis
Hepatitis B	3 dosis
Hib (influenza Hemofila tipo B)	4 dosis**
Pevnar (antineumococcica)	4 dosis**

Kinder - Grado 6

Vacuna	Se requiere
DTaP/DT (difteria, tétano, tosferina)	5 dosis
IPV (polio)	4 dosis ***
MMR (sarampión, paperas, rubéola)	2 dosis
Varicella (viruela loca) varisela	2 dosis*
Hepatitis B	3 dosis

Grados 7 - 12

Vacuna	Se requiere
Tdap	1 dosis~
IPV (polio)	4 dosis ***
MMR (sarampión, paperas, rubéola)	2 dosis
Varicella (viruela loca) varisela	2 dosis*
Hepatitis B	3 dosis

Vacunas Adicionales Recomendadas Por el ACIP NO SON REQUERIDAS para entrar a la escuela

--Influenza (flu)-gripe- vacuna anual para todos de 6 meses de edad para arriba

--HPV (Human Papillomavirus)-virus del papiloma humano- para niños y niñas de 11-12 años de edad.

--Meningococcal (meningitis)- Meningocócica- la primera vacuna es a los 11-12 años de edad, con un refuerzo a los 16 años.

Notas

* La vacuna de la varicela (viruela loca) no es requerida si el niño ha tenido ésta enfermedad y la enfermedad ha sido documentada con la firma un doctor.

Sin esta firma, la vacuna es requerida aun si usted cree que su niño ha tenido la enfermedad.

** La dosis total que se necesita depende de la edad que tenia el niño cuando recibió las dosis.

*** Todos los estudiantes de K – 4, todos los estudiantes nuevos y los estudiantes que actualmente están completando la serie de poliomieltis deben tener 6 meses de margen entre las últimas dos dosis y una dosis tiene que ser después de su 4to cumpleaños.

~ Se requiere que todos los estudiantes de los grados 7 – 12 tengan una dosis de Tdap (refuerzo contra tétanos, difteria y tos ferina) independientemente del intervalo de la última dosis de DTaP (vacuna contra tétanos, difteria y tos ferina) o Td (tétanos/difteria)

